

Doxycare® vet.



Smaksatta doxycyklin tabletter delbara i 2 eller 4 delar för hund och katt.

40 mg	VIKT/KG	TABL/DAG
	1	1
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	




200 mg	VIKT/KG	TABL/DAG
	10	1
15	1	
20	1	
25	1	
30	1	
35	1	
40	1	
50	1	
60	1	

Dosering: 10 mg doxycyklin per kg kroppsvikt per dag. Förpackningar: 20 tabletter.

Bakteriella luftvägsinfektioner (1,3)

orsakade av organismer som är känsliga för doxycyklin, inklusive *Staphylococcus aureus* och andra *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Bordetella bronchiseptica* samt *Pasteurella spp.*



Fästingburna infektioner (2,3)

Behandling av fästingburna infektioner av *Ehrlichia canis* hos hundar. För behandling av infektioner orsakade av *Ehrlichia canis* är dosen 10 mg doxycyklin per kg kroppsvikt per dag i 28 dagar.



För ytterligare information se [fass.se](#)

ATC VET-KOD QJ01AA02 RECEPTBELAGT GODKÄND SPC 2020-03-03



Nordvacc Läkemedel AB
Box 112, 129 22 Hägersten
Tel. 08-449 46 50
vet@nordvacc.se



NORDVACC

PART OF



en del av



Doxycare® vet.



■ Smaksatta och delbara tabletter för hund och katt:

- Tablett gulaktigt, rund, konvex tablett med korsformad brytskåra på ena sidan.
- Tabletterna kan delas i 2 eller 4 lika stora delar.

Referenser

- 1 Egberink H, et al. Bordetella bronchi-septica infection in cats. ABCD guidelines on prevention and management. J.Feline Med Surg, 2009 Jul 11 (7): 610-4.
- 2 Fourie JJ et al. The efficacy of a generic doxycycline tablet in the treatment of canine monocytic ehrlichiosis. J S Afr Vet Assoc. 2015 Mar 25; 86 (1): 1193.
- 3 SPC Doxycare vet.



Utdrag ur SPC⁽³⁾ för Doxycare® vet. Se [fass.se](#) för fullständig information.

Doxycare Vet, tabletter. ATCvet-kod: QJ01AA02 **Djurslag:** Katt och hund. **Indikationer:** Behandling av bakteriella luftvägsinfektioner hos katter och hundar orsakade av organismer som är känsliga för doxycyklin, inklusive *Staphylococcus aureus* och andra *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Bordetella bronchiseptica* samt *Pasteurella* spp. Behandling av fästingburen infektion av *Ehrlichia canis* hos hundar. **Kontraindikationer:** Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra tetracykliner eller mot något av hjälpämnen. Använd inte vid dystagi eller sjukdomar som involverar kräkning. Använd inte vid kräkning, matstrupsinflammation eller sårbildning i matstrupen. **Särskilda varningar för respektive djurslag:** Ehrlichios hos hund: Inled behandlingen så snart som de första kliniska tecknen uppträder. Hunden kan fortsätta att bära bakterien även efter långvarig antibiotikabehandling och kan därmed vara en reservoar för fortsatt smittspridning via fästingar (sjukdomens vektor). Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning: Särskilda försiktighetsåtgärder för djur, Överskrid inte den rekommenderade dosen. Eftersom tabletterna är smaksatta ska de förvaras utom räckhåll för djuren för att undvika oavsiktligt intag. På grund av sannolik variation (tidsmässig, geografisk) gällande förekomsten av doxycylinresistenta bakterier rekommenderas bakteriologisk provtagning och resistensbestämning. Officiella, nationella och lokala riktlinjer beträffande antimikrobiell behandling ska beaktas vid användning av läkemedlet. Om läkemedlet används på annat sätt än vad som anges i produktresumen kan det öka förekomsten av doxycyklinresistenta bakterier och minska effektiviteten hos behandling med andra tetracykliner till följd av potentiell korsresistens. För att minska sannolikheten för irritation i matstrupen och andra gastrointestinala biverkningar, som kräkning, ska läkemedlet ges tillsammans med foder. Lakta särskild försiktighet vid användning av läkemedlet hos djur med leversjukdom, eftersom ökning av leverenzymmer finns dokumenterat hos vissa djur efter behandling med doxycyklin. Läkemedlet ska användas med försiktighet hos unga djur eftersom tetracykliner som läkemedelsklass kan orsaka permanent missfärgning av tänderna om de ges medan tänderna fortfarande utvecklas. Forskningslitteratur på människor indikerar dock att det är mindre sannolikt att doxycyklin orsakar sådana avvikelser jämfört med andra tetracykliner, eftersom det har lägre benägenhet att bilda kelat med kalcium. **Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur:** Tetracykliner kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner). Personer som är överkänsliga mot tetracykliner ska undvika kontakt med detta läkemedel. Tvätta händerna efter hantering. Om du efter exponeringen får symtom som hudutslag ska du omedelbart söka läkarvård och visa bipacksedeln för läkaren. Doxycyklin kan orsaka gastrointestinala störningar efter oavsiktligt intag, särskilt hos barn. För att undvika oavsiktligt intag ska oanvända tabletdelar läggas tillbaka i det öppnade blistret och blistret ska sedan placeras i kartongen. Sök läkarvård vid oavsiktligt intag. **Dosering och administreringsätt:** Oral användning. Dosen är 10 mg doxycyklin per kg kroppsvikt per dag. I de flesta rutinfall förväntas respons efter mellan 5 och 7 dagars behandling. Behandlingen ska fortgå i 2–3 dagar efter kliniskt tillfrisknande för akuta infektioner. I kroniska fall och vid återfall kan en längre behandlingstid på upp till 14 dagar vara motiverad. För behandling av infektioner orsakade av *Ehrlichia canis* är dosen 10 mg doxycyklin per kg kroppsvikt per dag i 28 dagar. Det är inte alltid möjligt att fullständigt eliminera smittan, men utökad behandling i 28 dagar minskar de kliniska tecknen och bakteriebördan. Efter risk/nytta-bedomning av den ansvariga veterinären kan en längre behandlingstid krävas vid svårartad och kronisk ehrlichios. Alla behandlade patienter ska övervakas regelbundet även efter kliniskt tillfrisknande. Tabletterna ska ges tillsammans med foder. För att säkerställa att korrekt dos ges ska kroppsvikt fastställas med så stor noggrannhet som möjligt för att undvika underdosering. Tabletterna kan delas i två eller fyra lika stora delar för att säkerställa korrekt dosering. Placera tablett på en plan yta med brytskåran vänd uppåt och den konvexa (rundade) sidan vänd ned mot ytan. Halvor: tryck med tummarna på båda sidorna av tablett. Fjärdedelar: tryck nedåt med tummen eller ett annat finger i mitten av tablett. **Hållbarhet:** Hållbarhet i oöppnad förpackning: 30 månader. **Förpackning:** Kartong med 20 tabletter. Innehavare av godkännande för försäljning: Eucuphar NV Legeweg 157-1 B-8020, Oostkamp, Belgien. SPC godkänd 2020-03-03