


# Metrocare® vet.



Smaksatta metronidazol tabletter delbara i 2 eller 4 delar för hund och katt.



250 mg	
VIKT KG	ANTAL TABLETTER VID 2 GGR/DAG    1 GGR/DAG
1,25	—    ▲
2,5	▲    ▲▲
3,75	—    ▲▲▲
5	▲▲    ▲▲▲▲
7,5	▲▲▲    ▲▲▲▲▲
10	▲▲▲▲    ▲▲▲▲▲▲
15	▲▲▲▲▲    ▲▲▲▲▲▲▲
20	▲▲▲▲▲▲    ▲▲▲▲▲▲▲▲



SMAKSATTA  
TABLETTER



DELBARA  
TABLETTER

Dosering: 50 mg metronidazol per kg kroppsvikt per dag i 5–7 dagar. Förpackning: 20 tabl.

## Gastrointestinala infektioner (1,2,3)

Behandling av gastrointestinala infektioner orsakade av *Giardia spp.* och *Clostridia spp.* (dvs. *C. perfringens* eller *C. difficile*).



## Urogenitala infektioner (1)

Behandling av urogenitala infektioner samt infektioner i munhåla, svalg, och hud orsakade av strikt anaeroba bakterier (t.ex. *Clostridia spp.*) känsliga för metronidazol.



Infektioner i munhåla, svalg, och hud (1,4)

För ytterligare information se [fass.se](http://fass.se)

ATC VET-KOD QP51AA01 RECEPTBELAGT GODKÄND SPC 2019-07-08



Nordvacc Läkemedel AB  
Box 112, 129 22 Hägersten  
Tel. 08-449 46 50  
[vet@nordvacc.se](mailto:vet@nordvacc.se)



**NORDVACC**

en del av

PART OF



ANIMALCARE  
GROUP PLC





## Ansvarsfull användning av antibiotika.

I möjligaste mån ska läkemedlet endast användas baserat på resistensbestämning. Officiella, nationella och lokala riktlinjer beträffande antimikrobiell behandling ska beaktas vid användning av läkemedlet.

Följ doseringsanvisningarna.



# Metrocare® vet.



■ Smaksatta och delbara  
tabletter för hund och katt:

- Tablett vit till benvit rund konvex tablett med korsformad brytskåra på ena sidan.
- Tabletterna kan delas i 2 eller 4 lika stora delar.

## Referenser

- **1** SPC Metrocare vet.
- **2** Langlois DK et al. Metronidazole treatment of acute diarrhea in dogs: A randomized double blinded placebo-controlled clinical trial. Journal of Veterinary Internal Medicine, Nov 2019.
- **3** Burrows Colin F et al. Diagnosis and management of refractory diarrhea. Proceedings Bsava 2003.
- **4** P. Hennes, Periodontal Disease in Cats 1 - Aetiology and Assessment. International society of feline medicine 2010.

**Utdrag ur SPC(1) för Metrocare® vet. Se fass.se för fullständig information.**

Metrocare Vet 250mg tabletter. ATCvet-kod: QP51AA01 **Djurslag:** Hund och katt. **Indikationer:** Behandling av gastrointestinala infektioner orsakade av *Giardia* spp. och *Clostridia* spp. (dvs. *C. perfringens* eller *C. difficile*). Behandling av urogenitala infektioner samt infektioner i munhåla, svalg, och hud orsakade av strikt anaeroba bakterier (t.ex. *Clostridia* spp.) känsliga för metronidazol. Kontraindikationer: Använd inte vid nedsatt leverfunktion. Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnen. **Dosering:** För oral administrering. Rekommenderad dos är 50 mg metronidazol per kg kroppsvikt per dag i 5–7 dagar. Dygnsdosen kan delas upp i två lika stora doser som ges vid två administreringstillfällen (dvs. 25 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen). Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning: **Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:** På grund av sannolik variation (tidsmässig, geografisk) gällande förekomsten av metronidazol-resistenta bakterier rekommenderas bakteriologisk provtagning och resistensbestämning. I möjligaste mån ska läkemedlet endast användas baserat på resistensbestämning. Officiella, nationella och lokala riktlinjer beträffande antimikrobiell behandling ska beaktas vid användning av läkemedlet. I mycket sällsynta fall kan neurologiska symptom förekomma, särskilt efter långtidsbehandling med metronidazol. **Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur:** Mutagena och genotoxiska egenskaper för metronidazol har bekräftats både hos försöksdjur och hos människa. Metronidazol har påvisats vara karcinogent i försöksdjur och har möjligen karcinogena effekter hos människa. Dock saknas tillräckligt bevisunderlag för karcinogenicitet hos människa. Metronidazol kan vara skadligt för människofoster. Ogenomträngliga handskar ska användas vid administrering av läkemedlet för att undvika kontakt med huden och från hand till mun. För att undvika oavsiktligt intag, särskilt av ett barn, ska oanvända delar av tablettens läggas tillbaka i det tomma utrymmet i blisteret, läggas tillbaka i kartongen och förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Uppsök genast läkare vid oavsiktligt intag, och visa bipacksedeln eller etiketten. Tvätta händerna noggrant efter att du har hanterat tabletterna. Metronidazol kan orsaka överkänslighetsreaktioner. Vid känd överkänslighet för metronidazol ska kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet undvikas. **Förpackning:** Kartong med 20 tabletter. Innehavare av godkännande för försäljning: Ecuphar NV Legeweg 157-1 B-8020, Oostkamp, Belgien. SPC godkänd 2019-07-08